

코로나19 백신 접종 주의사항

접종 전

- ▶ 약, 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 접종 등에 대한 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 자세히 기록
- ▶ 1차 접종시 또는 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응이 나타난 경우 접종 금지
※ 아나필락시스 : 중증 알레르기 반응으로 쇼크, 호흡곤란, 의식소실, 입술·입안의 부종, 몸 전체 심한 두드러기 등의 증상 발생
- ▶ 코로나19 감염이 의심되는 경우, 발열 등 급성병증이 있는 경우 접종 연기
- ▶ 임산부, 소아청소년은 백신 접종 후 안전성·유효성에 대한 임상연구 결과가 나오기전까지 백신 접종을 권장하지 않음(백신별 국내 허가사항에 따라 변동 가능)
- ▶ 백신별 1차·2차 예방접종 간격을 반드시 준수하고 동일한 백신으로 접종
※ 백신별 접종 간격 : 아스트라제네카 8~12주, 화이자 3주
- ▶ 다른 감염병 예방접종은 코로나19 예방접종과 최소 14일 간격을 두고 접종

접종 후

- ▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부 관찰
- ▶ 접종 후 최소 3일간 주의 깊게 관찰하며 고열이 있거나 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 의사 진료 받아야
- ▶ 접종 부위는 항상 청결히 유지

이상 반응

- ▶ 접종부위 통증이나 부기, 발적 등의 국소반응이나 발열, 피로감, 두통, 근육통, 메스꺼움, 구토 등 전신반응은 접종 후 흔히 나타나는 이상반응으로 3일 이내 증상이 사라진다
- ▶ 알레르기 반응(두드러기, 발진, 얼굴이나 손 부기), 39도 이상 고열의 증상이 일상생활을 방해하는 정도 심해지면 의료기관 방문해 진료를 받아야
- ▶ 심한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실에 내원
※ 아나필락시스 : 중증 알레르기 반응으로 쇼크, 호흡곤란, 의식소실, 입술·입안의 부종, 몸 전체 심한 두드러기 등의 증상 발생

코로나19 예방접종 후 헌혈 금지기간 안내

◇ 코로나19 백신 접종에 따른 헌혈 금지기간에 대하여 사업장에 안내토
록 요청('21.2.20. 중앙재난안전대책본부)

□ 헌혈금지 기간

○ 코로나19 백신 접종을 맞게 되면 **접종일로부터 7일간** 헌혈참여가 금지되고, 백신 접종 후에 **이상 반응**이 있을 경우 증상이 사라진 날로부터 7일간도 헌혈 참여가 금지됨

○ 2차 접종하는 코로나19 백신의 경우에는 1회차 백신 접종 7일 후부터 2회차 백신 접종 전까지는 헌혈이 가능하며, 2회차 백신 접종 시 다시 접종일로부터 7일 후에 헌혈이 가능함

<해외 주요국 사례>

○ 해외 주요국가 별 코로나 백신 관련 헌혈금지 기간 ※출처: FDA 및 혈액원 홈페이지

	핀란드	미국	독일	영국	싱가폴
바이러스 벡터 백신	없음	없음	1일	7일	4주
불활화, mRNA백신					3일

* 코로나19 백신과 관련하여, 바이러스 벡터 백신과 기타 백신을 구분하거나 구분 없이 헌혈금지 기준 설정

□ 협조요청

○ 가급적 백신 접종 전 단체헌혈이 이루어질 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

* 단체헌혈시 방역수칙 준수

출처: 고용노동부